

「公印省略」

18福介連育第88号

平成18年8月31日

指定地域密着型サービス事業者 各位

福岡県介護保険広域連合事業課長

(育成指導係)

腸管出血性大腸菌感染症による集団発生について

このことについて、福岡県保健福祉部介護保険課長より別添のとおり通知がっております。指定地域密着型サービス事業者の皆様におかれましては、本感染症、食中毒の予防、衛生管理の徹底を図られますようお願いいたします。

＜問い合わせ先＞  
福岡県介護保険広域連合  
事業課育成指導係  
Tel 092-643-7055  
Fax 092-641-2432

(公印省略)

18介第1194号

平成18年8月21日

各保険者介護保険担当課長 殿

福岡県保健福祉部介護保険課長

( 指 導 係 )

腸管出血性大腸菌感染症による集団発生について

このことについて別添のとおり通知がありましたので、各保険者におかれましては、管内の各指定地域密着型サービス事業者等に対して、本感染症、食中毒の予防、衛生管理の徹底を図られますようお願いいたします。

「公印省略」

18健第2044号

18生衛第962号

平成18年8月14日

高齢者福祉課長  
子育て支援課長  
児童家庭課長  
障害者福祉課長  
監査保護課長

殿

保健福祉部健康対策課長

保健福祉部生活衛生課長

### 腸管出血性大腸菌感染症による集団発生について

このことについて、県内の保育施設での腸管出血性大腸菌O157による患者の集団発生の報告があり、また、別に散発事例の報告も増加しています。

貴課関係施設における本感染症・食中毒の予防及び発生時の対策については、すでに関係通知等により衛生管理の徹底を指導いただいているところですが、今後も予防対策に係るさらなる注意喚起等について、下記の事項を参考に、指導を徹底していただきますようお願いいたします。

### 記

#### 感染症予防策及び食中毒予防対策について

- (1) 排便後、食事の前、下痢をしている子どもや高齢者の排泄物の世話をした後などは、石けんと流水（汲み置きでない水）で十分に手洗いを行うこと。
- (2) 社会福祉施設等集団給食施設においては、「大量調理施設衛生管理マニュアル（平成9年3月24日付衛食第85号）に基づいて、衛生管理を行うこと。

## 腸管出血性大腸菌感染症（O157等）Q&amp;A（厚生労働省HPより）

Q1 腸管出血性大腸菌感染症とはどのような病気ですか。

- ・ 食品（生肉や野菜など）や水を介して、特定の大腸菌（腸管出血性大腸菌）に感染した場合に発症し、無症状や軽症で終わるものがほとんどですが水様の下痢、激しい腹痛、大量の鮮血便、嘔吐、高熱とともに、ときには重症になることもあります。
- ・ 多くの場合は、感染してからおおよそ3～8日あとに頻回の水様便で発病します。
- ・ これら症状のある方の6～7%が、初発症状の数日から2週間以内（多くは5～7日後）に溶血性尿毒症症候群（HUS）や脳症などを発症するといわれています。溶血性尿毒症症候群とは、尿量の減少、血尿、蛋白尿などを起こす状態で、意識障害や神経症状などを伴い、子どもと高齢者に起こりやすいです。

Q2 腸管出血性大腸菌感染症にかからないためにはどうすればいいのですか。

- ・ 食中毒の一般的な予防方法を守り、患者と濃厚な接触を避けましょう。
- ・ レバーなどの食肉を生で食べることは控え、加熱不十分な食肉（牛タタキなど）を乳幼児やお年寄りには食べさせないようにしましょう。
- ・ 食品や水のほか、患者や保菌者の便を介し、少ない菌量でも感染するため、患者や保菌者の便で汚染した衣類、寝具、おむつは、塩素系漂白剤にひたしてから洗濯しましょう。
- ・ 患者さんは、排便後は、せっけんをよく泡立てて流水で手を洗ったあと、消毒用アルコールで消毒しましょう。また、患者さんや保菌者の排泄物などの世話をしたあとも十分に手を洗いましょう。
- ・ 入浴やプールでも、周囲に感染させることがあるため、医師に相談し、菌が出なくなるまで、入浴やプールは控えましょう。
- ・ 飲食店に従事している方で調理従事者など直接飲食物に触れる業務の方は、検便で菌が検出されなくなるまで業務の変更などが必要です。

Q3 腸管出血性大腸菌感染症にかかったらどうすればいいのですか。

- ・ 安静にし、水分を補給し、消化しやすい食事を摂取します。
- ・ 水分もとれない場合は、輸液をすることもあります。
- ・ 菌を体外に排出するために、下痢止めや痛み止めの薬の使用は控えましょう。

# 福岡県における腸管出血性大腸菌の届出(発生)状況

